

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷十六

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官助教臣卜維吉

謄錄監生臣茅琳

欽定四庫全書

薛氏醫案卷十六

明薛己撰

外科樞要四

治瘡瘍各症附方

托裏消毒散 治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服之
未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生若腐肉既
潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血

虛者四物湯為主氣血俱虛者十全大補湯為主並
忌寒涼消毒之劑

人參

黃芪

鹽水拌炒

當歸

酒拌

川芎

芍藥

炒

白朮

炒

茯苓

各一錢

金銀花

白芷

各七分

甘草

炙五分

連翹

五分

右水煎服

托裏散 治瘡瘍因氣血虛不能起發腐潰收斂及惡
寒發熱者宜用此補托其屬六淫七情或諸經錯雜
之邪而為患者當各審其因而參以主治之劑其屬

胃氣虛弱者當以六君子湯為主

人參

氣虛者多用之

黃芪

炒各二錢

白朮

炒

陳皮

當歸

熟

地黃

白

茯苓

芍藥

酒炒各一錢半

右水煎服

清熱消毒散

治一切癰疽陽症腫痛發熱作渴

黃連

炒

山梔

炒

連翹

當歸

各一錢

川芎

芍藥

炒

生地黃

各一錢五分

金銀花

二錢

甘草

一錢

右水煎服

黃連消毒散

治腦疽背疽腫焮疼痛或麻木

黃連

製

羌活

各一分

黃芩

黃柏

各五分

生地黄

知

母製獨活

防風

當歸尾

連翹

各四分

藁本

防己

桔梗

各五分

黃芪

蘇木

陳皮

澤瀉

各二分

分人參

甘草

各三分

右水煎服

清涼飲

治瘡瘍煩躁飲冷焮痛脈實大便秘結小便

赤澁

大黃炒 赤芍藥 當歸 甘草各二錢

右水煎服

破棺丹 治瘡瘍熱極汗多天渴便秘譫語發狂

大黃

二兩五錢
半生半熟

芒硝

甘草各二兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九童便酒化下白

湯亦可

黃連解毒湯 治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脈洪數或發狂

言

黃芩

黃柏

炒

黃連

炒

山梔

各一錢五分

右水煎熟服

內疏黃連湯

治瘡瘍發熱而嘔大便秘結脈洪而實

黃連

芍藥

當歸

枳榔

木香

黃芩

梔

子

薄荷

桔梗

甘草

各一錢

連翹

大黃

各一錢五

分

每薑水煎仍量虛實治之

托裡榮衛湯

治瘡瘍外無焮腫內便調和乃邪在經

絡宜用此藥

黃芪

紅花

錢各一

桂枝

分七

蒼朮

米泔浸

柴胡

連翹

羌活

防風

當歸身

酒拌

甘草

炙

黃芩

人參

各一錢

右酒水煎服

內托復煎散

治瘡瘍腫焮在外其脈多浮邪氣勝必

侵於內宜用此托之

地骨皮

黃芩

炒

茯苓

白芍藥

炒

人參

黃芪

鹽水拌炒白朮炒桂甘草炙防已酒炒當歸酒拌各一錢防

風二錢

右先以蒼朮一升水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲之

人參敗毒散 治瘡瘍焮痛寒熱或拘急頭痛脈細有力

人參 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 枳

殼 茯苓 川芎 甘草

各一錢

右水煎服

仙方活命飲 治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者
即潰又止痛消毒之聖藥也

白芷 防風 沒藥 穿山甲

蛤粉炒黃

甘草 赤芍

藥 當歸尾 乳香 天花粉 貝母

各一錢

金銀

花 陳皮

各三錢

皂角刺

一錢

右酒一碗煎數沸服

清心湯 治瘡瘍腫痛發熱飲冷脈沉實睡語不寧即

防風通聖散每料加黃連五錢每劑一兩水煎服

奪命丹 治疔瘡發背等症或麻木或嘔吐重者昏憤

若疔毒牙關緊急用三五丸為末水調灌下有奪命之功

蟾酥

乾者輕粉各五分
酒化

枯礬

寒水石

煨

銅綠

乳

香

沒藥

麝香

各一錢

硃砂

三錢

蝮牛

二十箇另
研無亦効

右為末用蝮牛或酒糊丸菴豆大每服二三丸溫酒

葱湯下

東垣聖愈湯 治脾胃虧損膿水不止或金瘡出血心

煩不安眠睡不寧五心煩熱飲食少思

地黄

酒拌蒸
半日

生地黄

酒拌

人參

各五分

當歸

酒拌

黃芪

鹽水浸炒
各一錢

右水煎服

濟陰湯

治瘡屬純陽腫痛發熱

連翹

山梔

炒

黃芩

炒

黃連

炒各二錢

芍藥

一錢五分

金銀

花

二錢

甘草

一錢

牡丹皮

二分

右水煎服大便秘量加大黃

抑陽散 治瘡屬純陽腫痛發熱

天花粉

三兩

黃薑白芷

赤芍藥

各一兩

右為末茶湯調搽患處

沖和湯 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因

元氣虛弱失於補托所致

人參

二錢

黃芪

白朮

當歸

白芷

各一錢半

茯苓

川芎

阜角刺

炒

乳香

沒藥

各一錢

金銀花

一錢

陳

皮二錢甘草一錢

右水酒各半煎服

陰陽散 治瘡屬半陰半陽

紫荆皮炒五兩獨活去節炒一兩赤芍藥炒二兩白芷二兩石

菖蒲二兩

右為末葱酒調搽

回陽湯 治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛
不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆或陽氣脫陷等症

乾薑炮

附子

炮各二錢

人參

白朮

黃芪

各三錢

當歸

陳皮

甘草

炙各二錢

柴胡

升麻

各五分

右酒水煎服不應薑附倍之

抑陰散 治瘡瘍元氣虛寒焮腫不消或不潰斂或筋

攣骨痛一切冷症

草烏

二兩

白桂

五錢

赤芍藥

炒

南星

煨

白芷

右為末葱湯調塗執酒亦可

托裡溫中湯 治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因尅伐胃氣

脫陷腸鳴腹痛大便溇泄神思昏憤此寒變內陷緩則不治

羌活

四錢

附子

炮去皮

乾薑

炒三錢

益智

丁香

沉香

木香

茴香

陳皮

各一錢

甘草

炙二錢

右薑水煎服

附子理中湯 治瘡瘍脾胃虛寒或誤行攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子

人參

茯苓

白芍藥

各三錢

白朮

四錢

右水煎服

薑附湯 治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出多
失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈

人參

一兩 乾薑 炮

白朮

各五錢

附子

炮去皮
臍一兩

右作二劑水煎服

參附湯 治失血過多或膿瘀大泄或寒涼汗下真陽
脫陷上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等症急服以救
元氣緩則不治

人參 附子

炮去皮臍
各五錢

右薑五片水煎服不應倍之

獨參湯 治一切失血或膿水出多血氣俱虛惡寒發

熱作渴煩躁蓋血生於氣故血脫補氣陽生陰長之
理也用人參二兩棗十枚薑十片水煎徐徐服

人參理中湯 治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思
肚腹作脹或胸膈虛痞飲食不入

白朮 人參

乾薑 甘草

炙各
等分

右薑棗水煎服

竹葉黃芪湯 治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉

二錢

黃芪

麥門

當歸

川芎

甘草

黃芩

炒

芍藥

人參

半夏

石膏

煨各一錢

生地黃

一錢

右每服三五錢水煎服

竹葉石膏湯 治癰疽胃火盛腫痛作渴

淡竹葉

石膏

煨

桔梗

木通

薄荷

甘草

各一錢

當歸川芎散

治手足少陽經血虛瘡症或風熱耳內

痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水不調胸膈不利脇腹痞痛

當歸

川芎

柴胡

白朮

芍藥

各一錢

山梔

炒一

錢二分

牡丹皮

茯苓

各八分

蔓荊子

甘草

各五分

右水煎服

若肝氣不平寒熱加地骨皮肝氣實加柴胡黃芩氣

血虛加參芪歸地脾虛飲食少思加苓朮脾虛胸膈
不利加參芪痰滯胸膈不利加朮半肝氣不順胸膈
不利或小腹痞滿或時攻痛加青皮肝血不足胸膈
不利或小腹痞滿或時作痛加熟地肝血虛寒小腹
時痛加肉桂日晡發熱加歸地

梔子青肝散

一名柴胡
梔子散

治三焦及足少陽經風熱耳內

作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡

牡丹皮

梔子

炒各
一錢

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡子

炒各七分

甘草

五分

右水煎服若太陽頭痛加羌活

柴胡清肝散

治鬢疽及肝膽三焦風熱怒火之症或

項胸作痛或瘡毒發熱

柴胡

一錢五分

黃芩

炒一錢

人參

一錢

山梔

炒一錢五分

川芎

一錢

連翹

桔梗

八分

甘草

五分

右水煎服

小柴胡湯

治肝膽經症風熱瘰癧結核或腫痛色赤

或寒熱往來或日晡發熱或潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或吐酸食苦水皆用此藥

柴胡

二錢

黃芩

一錢

人參

半夏

各七分

甘草

炙五分

右薑水煎服

補陰八珍湯 治瘰癧等瘡屬足三陰虛者

當歸 川芎 熟地 芍藥 人參 白朮 茯苓

苓 甘草

黃柏

酒炒各

知母

酒炒各

七分

右水煎服

瀉青丸 治肝經實熱瘰癧腫痛寒熱或脇乳作痛大

便秘結

當歸

龍膽草

酒炒

川芎

山梔

大黃

炒

羌活

防風

各等分

右為末蜜丸雞頭子大每服一二丸白湯化下若血

虛者四物加山梔柴胡或逍遙散若腎水虧損不能

生肝木而自病筋攣結核或肢節拳攣或似中風宜

用六味丸加五味子

散腫潰堅湯 治癰癰堅硬氣血無虧宜用之

柴胡

四分

升麻

三分

連翹

三分

龍膽草

酒炒五分

黃芩

酒炒四分

甘

草

炙二分

桔梗

五分

昆布

五分

當歸尾

酒拌

白芍藥

炒

黃柏

酒炒葛根

各三分

知母

酒炒五分

三稜

酒拌

廣朮

各三分

瓜蒌

根

五分

右水煎服

益氣養榮湯 治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等

處患腫不問軟硬赤白腫痛或潰而不斂

人參 茯苓 陳皮 貝母 香附 川芎 黃

芪 鹽水拌炒 生地黄 酒拌 芍藥 炒各一錢 甘草 炙 桔梗 各五分 白

朮 炒二錢 柴胡 六分

右薑水煎服

必效散 治瘰癧氣血雖無虧損內有瘰核未去而不能愈

南硼砂 二錢五分 輕粉 一錢五分 麝香 五分 巴豆 五箇去皮心膜 白檳榔

一箇 斑猫 四十箇去頭翅同糯米炒

右同研極細末取鷄子二箇去黃用清調藥仍入殼
內以濕紙數重糊口入飯甑候熟取出曝乾研末虛
者每服五分實者一錢用炒生薑酒五更初調服如
覺小腹痛用益元散一服其毒俱從大便出胎婦勿
餌毒去後多服益氣養榮湯瘡口自合

針頭散 治一切頑瘡內有瘀肉癰核不化瘡口不合
宜用此藥腐之

赤石脂

錢五

乳香

白丁香

錢各

三

砒

錢一

黃丹

錢一

輕粉

麝香各五分
蜈蚣一條
灸乾

右為末搽瘀肉上其肉自腐若瘡口小或痔瘡用糊和作條子陰乾經之凡瘡久不合者內有膿管須用此腐之內服托裡之劑

神仙隔蒜灸法 治一切癰疽腫毒前論言之詳矣凡大痛或不痛或麻木痛者灸至不痛不痛灸至痛其毒隨火而散此拔引鬱毒從治之法也信有回生之功其法用大蒜頭切三分厚安瘡頭上用艾炷於蒜

上灸之五炷換蒜再灸未成即消已成殺其大勢瘡
患大以蒜杵爛攤患處將艾鋪蒜上灸之蒜敗再換
瘡色紫或白而不起發不作膿不大痛不問日期最
宜多灸

神效葱熨法 治流注結核骨癰鶴膝等症腫硬或先
已隔蒜灸而餘腫未消最宜用熨以助氣血而行壅
滯其功甚大又為跌撲傷損止痛散血消腫之良法
用葱白頭搗爛炒熟頻熨患處冷再換

神效桑枝灸 治發背不起或瘀肉不潰此陽氣虛弱
用桑枝燃火着吹熄焰用火灸患處片時日三五次
以助腫潰若腐肉已去新肉生遲宜灸四畔其陰瘡
癰癧流注賺瘡惡瘡久不愈者亦宜用之大抵此法
未潰則解熱毒止疼痛消瘀腫已潰則補陽氣散餘
毒生肌肉其陽症腫痛甚或重如負石初起用此法
出毒水即內消其日久者用之雖潰亦淺且無苦楚
惜患者不知有此治者亦不肯用此也

烏金膏 治發背中央肉死塗之即腐未死塗之即生
若初起腫痛用點數處其毒頓消若肉腐塗之即潰
若惡瘡頑瘡元氣無虧久不收斂者內有毒根以紙
撚蘸經其內有等發背因元氣虛弱或因尅伐元氣
胃氣虧損毒氣散漫中黯外赤不腐不潰服大補之
劑中塗三四寸許至五六日間赤黯之界自有裂紋
如刀割之狀中央漸潰漸脫須用純陽之藥以接其
元氣庶能收斂若妄用刀針去肉出血陽隨陰散元

氣愈傷或塗涼藥則毒氣不解氣血愈虛非徒無益而又害之其方用巴豆一味去殼炒黑研如膏點于患處臨用合之已上三法雖不出于方書余推其意而製用之良有奇驗

砭法 治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾之用線縛定兩手指輕撮筋梢令磁芒正對患處懸寸許再用筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出毒入

腹膨脹者難治

豆豉餅 治瘡瘍腫痛硬而不潰及潰而不斂并一切

頑瘡惡瘡用江西豆豉餅為末唾津和作餅子如錢
大厚如三文置患處以艾壯於餅上灸之乾則易之
如背瘡用漱口水調作餅覆患處以艾鋪餅上灸之
如未成者即消已成者亦殺其大毒如有不效氣血
虛敗也

乳香定痛散 治一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香

沒藥 各五錢

滑石

一兩

寒水石

一兩

冰片

右為細末搽患處痛即止甚效

青龍湯 治肺受風寒咳嗽喘急

半夏

湯泡七次
二兩五錢

乾薑

炮

細辛

麻黃

去節

肉桂

芍

藥

甘草

炙各
三兩

五味

二兩
并炒

右每服五錢薑水煎服

葶藶大棗瀉肺湯 治肺症胸膈脹滿上氣喘急或身

面浮腫鼻塞聲重用甜葶藶炒黃色研末每服三錢

棗十枚水二鍾煎一鍾去棗入藥再煎七分食後服

桔梗湯 治肺症咳嗽胸膈兩脇作痛咽乾口燥煩悶

作渴時出臭濁

桔梗

炒

貝母

去心

當歸

酒浸

瓜蒌仁

枳殼

麩炒

薏苡仁

微炒

桑白皮

炒

甘草節

各一錢

防己

去皮

黃芪

鹽水拌炒

五

味子

搗炒

百合

蒸各一錢五分

葶藶

炒

地骨皮

知母

炒

杏

仁

各五分

右薑水煎服

人參補肺湯 治肺症咳喘短氣或腎水不足虛火上炎痰涎湧盛或吐膿血發熱作渴小便短澀

人參 黃芪 白朮 茯苓 陳皮 當歸 各一錢

山茱萸 肉 山藥 各二錢 五味子 五分 麥門冬 七分 甘草 五分

分 熟地 自製一錢五分 牡丹皮 八分

右薑棗水煎服

人參平肺散 治心火尅肺傳為疽痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利若因肝木太過而致當補

肺若因腎水不足而患當補脾肺若因心火旺而自
病當利小便

人參 陳皮 甘草 地骨皮 茯苓 知母

錢各一

炒七分 青皮 四分 五味子 杵炒四分 天門冬 去心各四分 桑白皮

錢炒一

右水煎服

參芪補脾湯 治肺疽脾氣虧損久咳吐膿涎或中滿
不食必服此藥補脾土以生肺金石則不治

人參

白朮

各二錢

黃芪

二錢五分

茯苓

陳皮

當歸

錢各一分

升麻

三分

麥門冬

七分

五味子

四分

桔梗

六分

甘草

炙五分

右薑棗水煎服

射干湯

治胃癰吐膿血

射干

去毛

山梔仁

赤茯苓

升麻

各一錢

白朮

五分

赤

芍藥

一錢五分

右水煎服

薏苡仁湯 治風熱唇口瞤動或結核或浮腫

薏苡仁炒 防己

赤小豆

甘草

各各等分

右水煎服

瓜子仁湯 治產後惡露或經行瘀血作痛或作癱患

薏苡仁

四錢

桃仁去皮

牡丹皮

瓜蒌仁

各一錢

右水煎服

梅仁湯 治腸癰壅痛大便秘澀

梅仁

九箇去皮尖

大黃

炒

牡丹皮

芒硝

各一錢

犀角

鎊末

一 錢 冬瓜仁 研三
錢

右水煎入犀末服

大黃湯 治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如故或炊

赤微腫小便頻數汗出憎寒脈遲緊膿未成急服之

大黃炒 朴硝各一錢 牡丹皮 瓜蒌仁炒 桃仁去皮各

二 錢

右水煎服

牡丹皮散 治腸癰腹濡而痛時下膿

牡丹皮 人參 天麻 白茯苓 黃芪炒 薏苡

仁 桃仁去皮尖 白芷 當歸酒拌 川芎各一錢 官桂

甘草炙五分 木香

右水煎服

失笑散 治跌撲產後心腹絞痛或不知人事或經行

瘀血作痛成癰

靈脂 蒲黃俱炒等分

右每服二三錢酒水煎熟服

防風湯 治破傷風表症未傳入裡急服此

防風 羌活 獨活 川芎 各等分

右每服五錢水煎調蜈蚣散服

蜈蚣散

蜈蚣 一對 鱖 三錢
炙 燉

羌活湯 治破傷風在半表半裡間宜和解急服此湯
稍緩則邪入於裡不可用矣

羌活 菊花 麻黃 川芎 石膏 防風 前

胡黃芩 細辛 甘草 枳殼 白茯苓

各一兩

蔓荊子

一兩

薄荷

白芷

各五錢

右每服五錢薑水煎日二三服

大芎黃湯 治破傷風邪傳於裡舌強口噤項背反張筋惕搖擗痰涎壅盛宜急服之

川芎 羌活 黃芩

大黃

各一兩

右每服五七錢水煎服

白朮防風湯 治破傷風服表藥過多而自汗者

白朮

黃芪

各一兩

防風

二兩

右每服五七錢水煎服腑臟和而自汗者可服此藥
若臟腑秘小便赤而自汗者急服大芎黃湯下之

六味丸

一名六味地黃丸

此壯水之劑夫人之生以腎為主凡

病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無有不可
用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋秘痰氣壅
盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽喉燥
痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟齊損肝經不

足之症尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘖水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑也

熟地黄

用生者自製八兩

山茱萸

肉

山藥

各四兩

茯苓

牡

丹皮

澤瀉

各三兩

右地黄杵膏餘為末蜜丸桐子大每服七八十九滾湯下

八味丸

治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患

流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺即前方加肉桂附子各一兩經云益火之源以消陰翳即此方也

加減八味丸 治症同上即六味地黃丸加肉桂五味子各一兩

八珍湯 治脾胃傷損惡寒發熱煩燥作渴或瘡瘍潰後氣血虧損膿水清稀久不能愈即四君四物合方十全大補湯 治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或潰瘍膿

清寒熱自汗盜汗食少體倦發熱作渴頭痛眩暈似
中風狀即八珍湯加黃芪肉桂

補中益氣湯 治元氣虛損或因尅伐惡寒發熱肢體
倦怠飲食少思或不能起發消散生肌收斂或煎飲
食勞倦頭痛身熱煩燥作渴脈洪大弦虛或微細軟
弱

黃芪 人參 白朮 甘草 當歸 陳皮

各一分 各一錢五分

五升麻 柴胡 各三分

右薑棗水煎空心午前服

生脈散

治胃氣虧損陰火上衝口乾喘促或肢體倦

怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣汗出不止食少作
渴或膿水出多氣血俱虛煩燥不安睡臥不寧或濕
熱大行火土合病脾胃虛弱身重氣短或金為火制
絕寒水生化之源肢體痿軟脚敬眼黑等症

人參

五錢

麥門冬

二錢

五味子

一錢

右水煎服如不應倍之

人參養榮湯 治脾胃虧損氣血俱虛發熱惡寒四肢
倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣食少作渴凡大
病後最宜用此

人參

錢一

陳皮

錢一

黃芪

蜜炙

白芍藥

錢一

桂心

當歸

半炒

白朮

甘草

炙各

熟地黃

五味子

炒

茯苓

各

七

分
遠志

五
分

右薑棗水煎服

四君子湯

治脾胃虛弱或因尅伐腫痛不散潰斂不

能宜用此以補脾胃諸症自愈若誤服攻毒七惡隨
至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大
便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之
蓋氣能攝血故也若氣血俱虛之症宜于前湯但加
當歸脾胃無損飲食自進陰血自生若用四物湯沉
陰之劑脾胃復傷諸症蜂起若命門火衰而脾土虛
寒必用八味丸以補土母

人參 白朮

茯苓

各二錢

甘草

各一錢

右薑棗水煎服

六君子湯 治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯營氣諸症自愈即前方加陳皮半夏

異功散 治脾胃虛弱飲食少思即四君子湯加陳皮四物湯 治血虛發熱或因失血或因尅伐或因潰後致晡熱內熱煩躁不安皆宜服之經云血生於脾若脾虛不能生血者宜用四君子加當歸酒炒白朮以

補脾

當歸

三錢

熟地黃

三錢

芍藥

二錢

川芎

一錢

五分

右水煎服

歸脾湯 治憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不准晡熱內熱或唇瘡流注等症不能消散潰斂

白朮

白茯苓

黃芪

炒

當歸

龍眼肉

遠志

酸棗仁

炒人參

各一錢

木香

五分

甘草

炙三分

右薑棗水煎服

當歸補血湯

治脾胃損傷或服峻劑致血氣俱虛肌

熱大渴引飲目赤面紅晝夜不息其脈洪大而虛重
按全無此病多得於飢飽勞役者若誤服白虎湯必
死

當歸

三錢

黃芪

炙一兩

右水煎服

六一湯

黃芪

炙六錢

甘草

炙一錢

右水煎服

加味逍遙散

治肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒

熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或

內熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳

腹脹小便欠利

甘草

炙

當歸

芍藥

酒炒

柴胡

茯苓

白朮

炒

各一錢

牡丹皮 山梔

炒各七分

右水煎服

黃芩清肺飲 治腎經陰虛火燥而小便不通若因脾

經有熱當清其脾若因心火尅肺當制其心

黃芩 梔子

一錢 三箇 打碎

右水煎服

滋腎丸 治腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟等症

凡不渴而小便秘熱在下焦血分也最宜此藥經云

無陰則陽無以化若脾肺燥熱所遺當滋其化源

知母

黃栢

各酒炒
一兩

肉桂

右為末水丸桐子大每服百丸空心白滾湯下

五苓散 治下部濕熱瘡毒小便赤少

澤瀉

猪苓

肉桂

白朮

赤茯苓

各等
分

右為細末每服三二錢熱湯調下

犀角地黄湯 治胃火血熱妄行吐衄或大便下血者

犀角

鎊末

生地黃

赤芍藥

牡丹皮

各一
錢半

升麻

黃苓

炒各
一錢

右水煎熟入犀末服

若因怒而致如山梔柴胡若脾氣虛而不能攝用歸
脾湯若肝脾火動而妄行用加味道遙散若脾氣虛
而不能統用補中益氣湯加炮黑乾薑若血虛有火
而妄行用四物加炮薑若腎經虛火而血妄行用六
味丸料不應急加肉桂以引虛火歸源

清胃散

治膏粱積熱唇口腫痛齒齲潰爛焮痛連頭

面或惡寒發熱

升麻

二錢

生地黄

牡丹皮

黃連

當歸

酒洗各一錢

右水煎服痛未止石膏之類可量加

潤腸丸

治脾胃伏火大腸乾燥或風熱血結宜用此

丸通之若結在直腸宜猪膽汁導之蓋腎主五液開

竅於二陰若津液滋潤大便通調若津液不足脾氣

虧損必當培補猶忌前藥

麻子仁

桃仁

去皮尖各一兩

羌活

歸尾

大黃

煨 皁

角刺

秦朮

各五錢

右各另研為末煉蜜或猪膽汁丸桐子大每服三四

十丸白湯下若用猪膽汁導之而不結燥急補元氣

四神丸 治脾腎虛弱大便不實飲食少思或小腹作

痛或產後泄瀉肚腹作痛不思飲食

肉豆蔻

二兩

五味子

二兩

補骨脂

四兩

吳茱萸

浸炒

一兩

右為末水二碗生薑八兩紅棗一百枚煮熟取棗肉

和末丸桐子大每服五七十九空心食前白湯下

二神丸 治脾腎虛寒不思飲食或侵晨五更泄瀉或
飲食少思大便不實其功甚效如不應乃命門火衰
急用八味丸補火而生土

破故紙

四兩炒

肉豆蔻

二兩生用

右為末用大紅棗四十枚生薑四兩水煮熟去薑取
棗肉和藥丸桐子大每服五十九空心鹽湯送下

越鞠丸 治六鬱牙齒作痛口舌生瘡或胸膈痞滿嘔
吐吞酸或腹脹腿酸等症

蒼朮炒 神麴炒 香附 山查 山梔炒 撫芎 麥芽

炒各
等分

右為末水調麴蘖麴糊丸桐子大每服七十九白湯

下

二陳湯 治脾虛中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲

食少思等症

陳皮 半夏 茯苓各一錢 甘草炙五分

右薑水煎

錢氏白朮散 治胃氣虛或因尅伐或因吐瀉口乾作

渴飲食少思

藿香 白朮炒 木香 白茯苓 甘草炒 人參 各一

錢 乾葛二錢

右水煎服

生地黄丸 治師尼寡婦室女乍寒乍熱而患瘡瘍等

症肝脈弦長而出魚際

生地黄 一兩酒拌 秦艽 黃芩 硬柴胡 各五錢 赤芍

藥

一
兩

右為末入地黄膏加煉蜜少許丸桐子大每服三十丸烏梅煎湯下日進二服

加味地黄丸 治肝腎陰虛瘡症或耳內痒痛出水或眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澀等症

乾山藥 山茱萸 牡丹皮 澤瀉 白茯苓

熟地黄

柴胡

五味

各另為末等分

右將二地黄搗碎酒拌濕杵膏入前末和勻加煉蜜

為丸桐子大每服百丸空心白湯送下不應用加減
八味丸

琥珀膏 治頸項瘰癧及脇下初如梅子腫結硬強漸
如連珠不散不潰或潰而膿水不絕經久不瘥漸成
漏症

琥珀一兩木通 桂心 當歸 白芷 防風 松

脂 硃砂研各五錢麻油二觔丁香 木香各三錢木鱉子

肉五錢

右先用琥珀丁香桂心硃砂木香為末其餘藥入油
內煎黑濾去粗徐徐入黃丹再煎軟硬得中即成膏
矣

人參黃芪湯 治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參 麥門冬 陳皮 白朮 蒼朮 各五分 黃芪

一錢 黃栢 炒四分 升麻 歸身 各五分

右水煎服

托裏當歸湯 治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂或晡熱內

熱寒熱往來或婦人諸症經候不調小便頻數大便不實等症

當歸 黃芪 人參 熟地黃 川芎 芍藥

各一

錢

柴胡

甘草

各五分

右水煎服

人參內托散 治瘡瘍潰膿而作痛者

人參 黃芪 當歸 川芎 厚朴 防風 桔

梗 白芷 官桂 紫草 木香 甘草

右入糯米一撮水煎服

霍香正氣散 治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉或作瘧疾等症

桔梗 大腹皮 紫蘇 茯苓 白芷 半夏

陳皮 白朮 厚朴 各一錢 炙甘草 五分 霍香 一錢五分

右薑棗水煎服

升陽除濕湯 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便赤黃四肢困倦

甘草 麥芽 陳皮 猪苓各三分 澤瀉 益智仁

半夏 防風 神麴 升麻 柴胡 羌活各五分

分 蒼朮一分 白朮二分 茯苓七分

右薑棗水煎服

十宣散 治瘡瘍脈緩澀體倦惡寒或脈浮緊細用之

以散風助陽氣也

人參 當歸 黃芪 桔梗 炙草 白芷 川

芎各一錢 厚朴 防風 肉桂各五分

右水煎服

參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參 白朮

右水煎稠湯化服之

清燥湯 治元氣虛弱濕熱乘之肢體痠軟或頭目眩暈飲食少思口乾作渴或自汗盜汗胸滿氣促小便赤少大便不調等症

黃芪

一錢五分

五味子

九粒

黃連

二分

蒼朮

白朮

麥門

冬

生地黃

陳皮

澤瀉

各五分

茯苓

人參

去蘆

當歸

酒洗

升麻

各三分

神麴

猪苓

柴胡

炙草

各二分

分

黃栢

酒洗一分

右水煎服

補真丸

治真陰虧損諸症

葫蘆芭

炒

附子

陽起石

煨

肉蓯蓉

酒浸焙乾

五味子

肉苳菹

川烏

兔絲子

洗淨酒浸

沉香

鹿茸

酒浸

炒巴戟天去心鍾乳粉各一兩半

右為末用羊腰子兩對治如食法酒煮搗爛入酒糊
丸如梧桐子大每服七十九空心米飲鹽湯任下

托裏健中湯 治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食
少思或作嘔瀉等症

人參 白朮 茯苓各二錢 半夏 炮薑各一錢 炙草

五分黃芪一錢五分 肉桂三分

右薑棗水煎服

托裏益中湯 治中氣虛弱飲食少思或瘡不消散或
潰而不斂

人參 白朮 陳皮 半夏 茯苓 炮薑

各一錢

木香 炙草

各五分

右薑棗水煎服

托裏益青湯 治脾土虛弱肝木所侮以致飲食少思
或胸膈不利等症

人參 白朮 茯苓 半夏 芍藥 柴胡

各一錢

各一錢

各五分

分 陳皮 一
錢 甘草 五
分

右薑棗水煎服

托裏益黃湯 治脾土虛寒水反侮土以致飲食少思
或嘔吐泄瀉等症

人參 白朮 陳皮 茯苓 半夏 各一
錢 炮薑

丁香 炙草 各五
分

右薑棗水煎服

托裏越鞠湯 治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等症

人參 白朮 各二錢 陳皮 半夏 各一錢 山梔 川芎

香附 蒼朮 各七分 炙草 五分

右薑棗水煎服

乳香止痛散 治瘡腫痛不止

粟殼 三錢 白芷 一錢五分 炙草 陳皮 各一錢 乳香 五分 沒藥

五分 丁香 三分

右作二劑水煎服

濟生犀角地黄湯 治鬱熱不解衄血便血等症

犀角 生地 白芍藥 牡丹皮 各等分

右每服五七錢水煎服加減全上亦治便血

痔瘡方

雄黃 五分 五靈脂 去石燒過斷煙 五倍子 泡過各一錢 白礬 半飛

半 沒藥 二錢半 生 明淨者

右為細末研令極細用紙花子貼瘡口上

猪蹄湯

香白芷 黃芩 赤芍藥 生甘草 當歸 羌

活露蜂房

取有蜂兒者

右先將猪蹄一隻用水數碗煮熟取清汁分作十數次每次用前藥一兩煎十數沸去滓無風處淋洗死肉惡血隨洗而下極效

神效瓜萋散 治乳癰初起者自消膿成者自潰及一切癰疽或潰後餘毒亦宜用之

黃瓜萋

一枚 當歸

五錢

生甘草

五錢

乳香

沒藥

各一錢

右用水酒煎服

清肝解鬱湯 治肝經血虛風熱或肝經鬱火傷血乳
內結核或為腫潰不愈凡肝膽經血氣不和之症皆
宜用此藥

人參一錢 柴胡八分 白朮一錢五分 牡丹皮八分 茯苓一錢 陳皮

八分 甘草五分 當歸一錢五分 貝母一錢 川芎八分 山梔炒 芍藥

炒熟地黃各一錢

右水煎服

清肝益榮湯 治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或

耳項胸乳脇肋作痛或作瘕子并一切肝火之症

山梔

當歸

木瓜

不犯
鐵器

茯苓

各一
錢

柴胡

川芎

芍藥

炒各
七分

龍膽草

八分

白朮

二錢

熟地

一錢
五分

炙草

五分

右薑水煎服

益元散

滑石

六兩

甘草

一兩

右為末每服一錢酒調下

神效開結散

治癭疾不問年歲極驗

沉香 木香

猪厭肉子

生於豚猪項下

橘紅

四兩 珍珠 四

九粒砂鍋內泥封口煨過
綠一枚如棗大取四十九

右為末每服一錢臨卧冷酒調搽徐徐嚥下輕者三

五服重者一料全愈修合用除日效忌鹹酸油膩滯
氣等物

海藻散堅丸 治肝經癭瘤

海藻

昆布

各二兩

龍膽草

二兩 小麥

四兩醋
黃炒乾

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十九臨卧白湯送

下并噙化嚥之

普濟消毒飲 治天行時毒頭面腫痛或咽喉不利若
饑饉之後患之最宜用仍當固胃氣

黃芩

連翹

各五錢

人參

三錢

陳皮

玄參

甘草

柴胡

桔梗

各一錢

牛蒡子

馬勃

板藍草根

各七

分白殭蠶

升麻

各五分

右水煎服大便秘量加大黃

通氣散 治時毒腫甚取嚏以泄其毒

玄參

一錢五分

猪牙皂角

川芎

各一錢

藜蘆

五分

羊躑躅

花

二錢五分

右為末用紙撚蘸少許入鼻內取嚏為度

防風通聖散

治時毒熱毒便秘熱燥若時毒饑饉之

後胃氣虧損者須當審察非大滿大實不用

防風

當歸

川芎

芍藥

大黃

芒硝

連

翹

薄荷

麻黃

桔梗

石膏

黃芩

各一兩

白

木

山梔

荆芥

各二錢五分

甘草

二兩

滑石

一兩

右水煎服或為末白湯調下仍量人虛實

葛根牛蒡湯 治時毒腫痛而便利調和者

葛根

貫仲

甘草

又名國老

豆豉

牛蒡子

半生半炒各二

錢

右水煎服

犀角升麻湯 治時毒或風熱頭面腫痛或咽喉不利

或風熱髮疽疔瘰等症

犀角 升麻

防風

羌活

各一錢

白芷

黃芩

各五

分
白附子五分
國老六分

右水煎服

白芷胃風湯 治手足陽明經氣虛風熱面目麻木或

牙關緊急眼目瞤動

白芷

二錢五分

升麻

二錢五分

葛根

蒼朮

米泔炒各八分

炙草

一錢

五分當歸

一錢五分草薺

芫

柴胡

黃柏

藁本

羌

活各四分

蔓荆子

三分白殭蠶

三分麻黃

去節七分

右水煎服

升麻黃連湯 治胃經熱毒腮腫作痛或發寒熱

升麻 川芎 當歸 各一錢半 連翹 黃連 牛蒡子

白芷 各一錢

右水煎服 燉連太陽加羌活連耳後加山梔柴胡

梔子仁湯 治時毒瘡痛大便秘結

鬱金 枳殼 升麻 山梔 炒各一錢

右水煎服

雙解散 治便癰內蘊熱毒外挾風邪或交感失宜精

血交錯以致癰痛大小便秘結先用此藥通解更用
調補之劑

辣桂 大黃 白芍藥 澤瀉 牽牛并炒炙草

桃仁 乾薑各五分

右水煎服

製甘草法 治懸癰不拘腫潰

右每用大甘草一兩切五寸許用澗水一碗浸透以
慢火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾為度却挫細

用水二鍾煎八分空心服

大蘆薈丸

一名九味蘆薈丸

治肝火下疳潰爛或作痛焮腫或

治小兒疳膨食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等瘡并蝕
肛門痒痛

胡黃連 蘆薈 黃連 木香 白蕪荑 青皮

白雷丸

鶴虱草

各一兩

麝香

一錢

右為末蒸餅糊丸桐子大每服一錢空心米湯下

八正散 治下疳便毒小便淋瀝脈症俱實者

大黃 車前子 瞿麥 扁蓄 山梔 木通各二

錢 滑石 二兩 甘草 一錢

右水煎服

內托羌活湯 治臀癰腫痛兩尺脈緊按之無力者

羌活 黃柏 各一錢 防風 藁本 肉桂 連翹

炙草 蒼朮 陳皮 黃芪 各一錢五分

右水酒煎服

大防風湯 治足三陰經虧損外邪乘虛患鶴膝風或

附骨疽腫痛或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更用調補之劑

附子

牛膝

各一錢

白朮

羌活

人參

防風

川芎

一錢五分

辣桂

黃芪

白芍藥

杜仲

熟地

甘草

炙各五分

右水煎服

加味龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱或囊癰便毒下疳

懸癰腫焮作痛小便澀滯或婦人陰瘡痒痛或男子

陰挺腫脹或出膿水

龍膽草

澤瀉

各一錢

車前子

生地黄

木通

當歸尾

山梔

枯黃芩

炙甘草

各五分

右水煎服

清心蓮子飲

治膀胱氣虛濕熱玉莖腫痛或莖竅澹

滯口苦咽乾小便色赤或白濁夜安靜而晝發熱

黃芩

麥門冬

地骨皮

車前子

炙甘草

各一

錢五分

石蓮肉

白茯苓

黃芪

柴胡

人參

各一錢

右水煎服

五淋散 治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如沙

石或如膏汁或熱沸便血

赤茯苓

一錢五分

赤芍藥

山梔

各一錢

當歸

甘草

各一

錢五分

右用燈心二十根煎服

清肺飲 治渴而小便不利乃肺經有熱是絕寒水生

化之源宜用此藥以清化源其水自生而便自利矣

茯苓

二錢

猪苓

三錢

澤瀉

五分

琥珀

五分

燈心

一分

木通

七分

通

草

六分

車前子

一分

瞿麥

五分

扁蓄

七分

右為細末每服五錢水煎服

腎氣丸

治腎經陽虛陰無所化以致膀胱淋漓或脾

肺氣虛不能通調水無所化而膀胱癃閉或腎氣虛

熱干於厥陰之絡陰挺痿痺而溺頻數或腎水虛弱

陰虧難降使津液敗濁而為痰水又治腎虛便血及

諸見血發熱自汗盜汗等症之聖藥也 六味丸方

見前

還少丹 治足三陰經虛損患偏風等症又補脾腎進

飲食之良劑也

肉蓯蓉

去甲酒浸

遠志

去心甘草湯泡去骨

茴香

炒

巴戟

去心

枸杞

子

山藥

牛膝

熟地黃

為膏

石菖蒲

杜仲

五味子

白茯苓

楮實子

山茱萸

各等分

右為末用紅棗肉同蜜為丸桐子大每服七十九溫

酒送下每日三服白湯送下

不換金正氣散 治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈寒
熱少食

厚朴 藿香 半夏 蒼朮 陳皮 甘草 各等分

右薑棗水煎服

槐花散 治腸風濕毒下血

槐花 青皮 各六分 當歸 一錢 荆芥 熟地黄 白朮

各六分 川芎 四分 升麻 二錢

右水煎服

四生散 治膝腿瘡淫不愈或目昏花名腎臟風并治
風癬疥癩血風瘡症

白附子

真者
生用

黃芪

獨活

茯苓

各等
分

右為末每服二錢用猪腰子一枚批開入藥濕紙包
裏煨熟空心連腰子細嚼鹽湯送下

消風散

一名人參
消風散

治風熱癩疥搔痒發熱或頭皮腫痒

頭目昏眩鼻流清水嚏噴聲重耳作蟬鳴

荆芥穗 炙草 人參 白殭蠶 白茯苓 防

風 芎藭 藿香 蟬蛻各二兩 陳皮 厚朴薑製 羌

活各五分

右為末每服三錢茶清調下瘡癬溫酒下

升麻和氣飲 治風癬瘡疥熱結大便不通

當歸 陳皮各一錢半 芍藥酒炒 枳殼麩炒各八分 半夏薑製 蒼

朮米泔浸炒 桔梗炒黃 白芷浸軟切片 乾葛浸軟切片 白茯苓

炙草各一錢 乾薑炮 大黃各五分 升麻三分

右水煎服

換肌消毒散 治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓

五錢

當歸

酒洗

白芷

皂角刺

各一錢

薏苡仁

一錢

白蘚皮

木瓜

不犯鐵器

木通

金銀花

各七分

炙草

五分

右水煎服

九味羌活湯

治風熱鬱遏瘡焮作痛或遍身作痛或

拘急不利又治頭痛惡寒脊強脈浮緊又治非冬時

天有暴寒人中之頭痛寒熱宜用此以代麻黃湯此

神藥也

羌活 防風 蒼朮 各一錢半 川芎 白芷 生地

黃芩 煑軟切片 細辛 甘草

右水煎服衣覆之取微汗濕陰天加蒼朮天淫雨亦

加如渴加石膏三錢知母一錢不渴不加

加味羌活散 即前湯加金銀花連翹

當歸飲子 治風濕所傷以致瘡疥等症

當歸 黃芪 芍藥 荆芥穗 防風 蒺藜

何首烏 生地黃 川芎 甘草 各等分

右水煎服

黑丸子

一名和血定痛散

治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫

或外感風寒肢體作痛苦流注膝風初結服之自消
若潰後氣虛而發熱與補劑兼服自斂

百草霜

一兩

白芍藥

一兩

川烏

三錢

赤小豆

一兩

白欬

一兩

白芨

當歸

各八錢

南星

三錢

牛膝

焙六錢

補骨

脂焙八錢

右各另為末酒糊丸桐子大每服三十九鹽湯溫酒

任下孕婦不可服

太乙膏 治一切瘡瘍並宜貼之若元氣無虧用隔蒜
灸更服活命飲以收全功

玄參 白芷 當歸 肉桂 大黃 赤芍藥

生地黄

各一兩

右用麻油二觔入銅鍋內煎至黑濾去渣入黃丹十
二兩再煎水中捻軟硬得中即成膏矣

藜蘆膏 治一切瘡疽疔肉突出不問大小長短用藜

蘆一味為末以生猪脂和研如膏塗患處周日易之
治便血括云四兩吳茱四兩連一同鍋炒不同研糞
前紅用茱調酒糞後紅用酒調連元氣虧損者當以補藥
加之方效二味用熱湯拌濕頓滾湯中半日藥氣相
和炒焦各揀出聽用甚妙即製茱萸黃連法也

黃礬丸 治金石發疽及一切瘡疽解毒止痛

明白礬

一兩黃蠟五錢

右鎔蠟和礬末急和勻衆手丸桐子大每服十九漸

漸加二十九滾湯下如服金石發疽別用白礬末一兩作三五服溫酒調下有人遍身生瘡狀如蛇頭服之即效此藥能解毒氣內攻須多服有效治蛇毒咬鎔滴傷處痛止毒出仍服兩許

當歸膏 治發背癰疽湯火等症去腐肉生新肉其肉未壞者用之自愈肉已死而用之自潰新肉易生搽至肉色漸白其毒始盡生肌最速其外肉焮乾爬連好肉作痛用之即愈亦不結痂又免皺揭之痛殊有

神效蓋黃蠟主生肌止痛補血續筋性味甘溫非偏
勝毒藥故與新肉相宜此方余已刊行近之治者亦
多用之

川當歸

一兩

麻油

真正者
四兩

淮慶生地

一兩

黃蠟

一兩如
白蠟止

錢用五

右先用當歸地黃入油煎黑去渣入蠟鎔化候溫攪
勻即成膏矣用塗患處將紙蓋之發背癰疽湯火等
症潰爛用之尤妙凡死肉潰爛已盡好肉有些須尚

連宜用利刀剪之蓋死肉有毒去遲則傷新矣如洗
拭換膏必須預備即貼之若死肉去盡尤宜速貼然
新肉畏風尤甚不可忽也

蠲痺消毒散 治時瘡肢節筋攣

薑黃 土茯苓

獨活

各五錢

白朮

當歸

各一錢半


赤

芍藥

一分五錢 白芷

五分

右水煎服




右肩尖肘尖二穴圖

即肩髃肘膠

此穴治療癰之秘法蓋癰瘰屬肝膽二經故患耳前
後項腋之間男子多因恚怒虧損肝經之血陰火內
作或不慎起居耗損腎水不能生肝血婦女多因恚
怒傷肝火動血燥或鬱結傷脾火動血耗或患於胸
乳間亦屬於前經此症若因恚怒傷肝氣血壅遏而
不愈者宜灸此穴疎通經絡若因久於鬱怒元氣虧
損而不愈當推其所屬而調補化源如取其穴當以

指甲指兩肘兩肩四所患處覺酸麻方是其穴



薛氏醫案卷十六

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷十七

詳校官太醫院醫士 臣舒岱

編修 臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允 臣王燕緒

校對官修撰 臣吳錫齡

謄錄監生 臣馮萬程

欽定四庫全書

薛氏醫案卷十七

明薛己撰

癰瘍機要

內經云風氣與太陽俱入行諸脈俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤膜而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也有榮衛熱腑其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客有脈而不去名曰癰風其治

法當刺肌肉骨髓以洗滌衛之沸熱靈樞經以銳針刺腫
上出惡血近代先哲云感天地肅殺惡氣所致其上體先
見或多者毒在上也下體先見或多者毒在下也蓋氣受
邪則上多血受邪則下多氣血俱受則上下齊見若鬚毛
先落毒在肺面發紫泡者毒在肝脚底先痛或穿者毒在
腎遍身如癬者毒在脾目先損者毒在心此五臟受症之
重也一日皮死麻木不仁二日肉死針刺不痛三日血死
爛潰四日筋死指脫五日骨死鼻柱壞此臟受傷之不可

治也若聲啞目盲尤為難治大抵此症多由勞傷氣血腠理不密或醉後房勞沐浴或登山涉水外邪所乘衛氣相搏濕熱相火血隨火化而致故淮揚嶺南閩間多患之治當辨本症兼症變症類症陰陽虛實而治焉若妄投燥熱之類膿水淋漓則肝血愈燥腎水愈傷相火愈旺反致敗症矣

本症治法

一癘瘍所患非止一臟然其氣血無有弗傷兼症無有弗雜況積歲而發現於外須分經絡之上下病勢之虛

實不可驟施攻毒之藥當先助胃壯氣使根本堅固而後治其瘡可也經云真氣奪則虛邪氣勝則實凡云病屬有餘當認為不足

一癰瘍當知有變有類之不同而治法有汗有下有砭刺攻補之不一蓋兼症當審輕重變症當察先後類症當詳真偽而汗下砭刺攻補之法又當量其人之虛實究其病之源委而施治之蓋虛者形氣虛也實者病氣實而形氣則虛也

一癩瘍砭刺之法子和張先生謂一汗抵千針蓋以砭血不如發汗之周遍也然發汗即出血出血即發汗二者一律若惡血凝滯在肌表經絡者宜刺宜汗取委中出血則效若惡毒蘊結於臟非蕩滌其內則不能痊若毒在外者非砭刺遍身患處及兩臂腿腕兩手足指縫各出血其毒必不能散若表裏俱受毒者非外砭內泄其毒決不能退若上體患多宜用醉仙散取其內蓄惡血於齒縫中出及刺手指縫并臂腕以去肌表毒血下

體患多宜用再造散令惡血陳蟲於穀道中出仍針足指縫并腿腕隔一二日更刺之以血赤為度如有寒熱頭疼等症當大補血氣

一癘瘍服輕粉之劑若腹痛去後兼有膿穢之物不可用藥止之若口舌腫痛穢水時流作渴發熱喜冷此為上焦熱毒宜用瀉黃散若寒熱往來宜用小柴胡湯加知母若口齒縫出血發熱而大便秘結此為熱毒內淫宜用黃連解毒湯若大便調和用濟生犀角地黃湯若

穢水雖盡口舌不愈或發熱作渴而不飲冷此為虛熱也宜用七味白朮散

一癘瘍手足或腿臂或各指拳攣者由陰火熾盛虧損氣血當用加味逍遙散加生地黄及換肌散兼服

一癘瘍生蟲者五方風邪翕合相火制金木盛所化內食五臟而症見外也宜用升麻湯送瀉青丸或樺皮散以清肺肝之邪外灸承漿以疏陽明任脈則風熱息而蟲不生矣肝經虛熱者佐以加味逍遙散六味地黄丸

一癘瘍久而不愈有不慎起居飲食內火妄動者有臟腑傷損氣血疲乏者有用攻伐之藥氣血愈虧者有不分兼變相雜用藥失宜者有病人諱疾忌醫者

一癘瘍愈而復發有不戒厚味內熱傷脾者有不戒房勞火動傷腎者有不戒七情血氣傷損者有餘毒未盡兼症干動者有氣虛六淫外乘者古人云此症百無一生正謂此耳

兼症治法

一頭目眩暈若右寸關尺脉浮而無力脾肺氣虛也用
補中益氣湯若左關尺脉數而無力肝腎氣虛也用六
味地黄丸若右寸尺脉浮大或微細陽氣虛也用八味
地黄丸血虛者四物湯加參苓白朮氣虛者四君子湯
加當歸黃芪肝經實熱者柴胡清肝散肝經虛熱者六
味地黄丸脾氣虛弱者補中益氣湯脾虛有痰者半夏
白朮天麻湯砭血過多者芎歸湯發熱惡寒者聖愈湯
大凡發熱則真氣傷矣不可用苦寒藥恐復傷脾胃也

一口喎目斜若手足牽搐或鬚稜痒動屬肝經血虛風
熱用加味逍遙散六味地黄丸以生肝血滋腎水若寒
熱往來或耳聾脇痛屬肝木熾盛先用小柴胡合四物
湯以清肝火生肝血若筋攣骨痛或不能動履用六味
地黄丸補中益氣湯以滋化源若因服燥藥而致者用
四物湯加生甘草金銀花以解熱毒益陰血凡此俱屬
肝經血燥所致須用六味地黄丸補中益氣湯為主若
因怒氣房勞而甚者用六味地黄丸十全大補湯為主

若因勞傷形體而甚者用補中益氣湯十全大補湯為主
一夏秋濕熱行令若飲食不甘頭目眩暈遍身酸軟
或兩腿麻木口渴自汗氣促身熱小便黃數大便稀澆
濕熱傷元氣也用清燥湯如在夏令用清暑益氣湯若
自汗盜汗氣高而喘身熱脉大元氣內傷也用補中益
氣湯若嘔吐少食肚腹痞悶大便不實脾胃受傷也用
六君子湯若胸腹不利飲食少思吐痰不止脾胃虛痞
也用六君湯若形氣倦怠肢體麻木飲食少思熱傷元

氣也用人參益氣湯

一熱渴便濁若夜寒晝熱者熱在氣分也用清心蓮子
飲晝安夜熱者熱在血分也用四物二連湯俱佐以六
味地黃丸若寒熱往來者肝經血虛也用加味逍遙散
六味地黃丸

一小便不利若因服燥藥而致者用四物湯加炒黑黃
柏知母生甘草以滋陰血若頻數而色黃者用四物湯
加參木麥門五味子以生氣血若短而色黃者用補中

益氣湯加山藥麥門五味以滋化源經云無陰則陽無以生無陽則陰無以化

一大便不通若血虛內熱而澁滯者用四物湯加麥門五味子以生血潤燥若因燥熱之藥而患者用四物湯加連翹生甘草以生血清熱若服尅伐之藥而致者用四君湯加芎歸以助氣生血若作渴飲冷者熱淫於內也用竹葉石膏湯以清胃火若作渴飲湯者腸胃虛熱也用竹葉黃芪湯以補氣生津若內熱作渴面赤飲湯

者用四物湯送潤腸丸以涼血潤燥若腸胃滿脹燥在直腸而不通者用猪膽汁導之腸胃氣虛血涸而不通者用十全大補湯若肝膽邪盛脾土受侮而不能輸化者用小柴胡湯加山梔郁李仁枳殼治之

一怔忡無寐或兼衄血便血若內熱晡熱作渴飲湯肢體倦怠此脾血虛而火動也用四君子加芎歸若思慮傷脾動火而致用歸脾湯加山梔若發熱晡熱用八珍湯加酸棗仁茯神遠志若因心血虛損用栝子仁散大

抵此症皆心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安不必專於清熱治痰

一發熱惡寒若肢體倦怠煩躁作渴氣高而喘頭痛自汗者此內傷氣血也用補中益氣湯加五味麥門倦怠食少大便不調小便頻數洒淅惡寒者此脾肺氣虛也用升陽益胃湯煩躁作渴體倦少食或食而不化者此脾氣虛熱也用六君子湯

一發熱在午前脈數而有力者氣分熱也用清心蓮子

飲脉數而無力者陽氣虛也用補中益氣湯午後脉數而有力者血分熱也用四物湯加牡丹皮脉數而無力者陰血虛也用四物湯加參朮熱從兩脇起者肝虛也用四物湯加參朮黃芪從臍下起者腎虛也用四物湯加參朮黃栢知母五味麥門肉桂或六味丸其熱晝見夜伏夜見晝止或去來無定時或起作無定處或從脚起者此無根虛火也須用加減八味丸及十全大補湯加麥門五味更以附子末唾津調搽湧泉穴若形體惡

寒喜熱飲食者陽氣虛寒也急用八味丸

一口乾若惡冷飲食者胃氣虛而不能生津液也用七
味白朮散若喜飲冷食者胃火盛而消燥津液也須用
竹葉石膏湯夜間發熱口渴者腎水弱而不能上潤也
當用六味地黃丸若因汗下之後而有前患胃氣虛也
宜用八珍湯主之

一作渴若煩躁飲冷者屬上焦實熱用涼隔散兼大便
秘結者屬下焦實熱用清涼飲若用剋伐之藥而渴者

氣血虛也急用八珍湯六味丸

一耳聾耳鳴若左寸關脈弦數者心肝二經虛熱也用
四物湯加山梔柴胡生陰血右寸關脈浮大者脾肺二
經虛熱也用補中益氣湯加山梔桔梗培陽氣若因怒
便作用小柴胡湯加山梔芎歸清肝清血若午前甚用
小柴胡湯加參芪歸朮補氣清肝午後甚用四物湯加
酒炒黑黃栢知母五味補陰降火如兩足心熱屬腎虛
用六味丸以壯水之主兩足冷屬陽虛用八味丸以益

火之源

一項強口噤腰背反張者氣血虛而發瘧也仲景張先生云足太陽病發汗太多則瘧風病下之則瘧復發汗則加拘急瘡家發汗則瘧蓋風能散氣故有汗而不惡寒曰柔瘧寒能澀血故無汗而惡寒曰剛瘧皆因內虛復汗亡津血筋無所養而然悉屬虛象非風症也當大補氣血為主故產婦潰瘍勞傷氣血濕熱相火誤服尅伐之劑者多患之其義可見

近以瘧為瘧傳寫之誤也

一婦女經閉若因鬱火傷脾以歸脾湯加山梔丹皮氣血俱虛以八珍湯加山梔丹皮若因服燥藥傷血以四物湯加生甘草若經候過期而來者氣血虛也八珍湯倍用參朮先期而來者血虛熱也四物湯倍加參朮牡丹皮將來而作痛者氣虛血滯也四物湯加茯苓白朮香附色紫而成塊者血熱也四物湯加山梔丹皮作痛而色淡者血氣虛也用八珍湯其血崩之症肝火不能藏血者用加味道遙散脾虛不能統血者用補中益氣

湯凡此皆六淫七情虧損元氣所致當審其因而調補
胃氣為善

變症治法

一身起疙瘩搔破膿水淋漓若寒熱往來者肝經氣血
虛而有火也用八珍散加丹皮柴胡寒熱內熱者血氣
弱而虛熱也用八珍散倍用參朮若惡寒形寒者陽氣
虛寒也用十全大補湯若肌膚搔如帛隔者氣血不能
外榮也用人參養榮湯若面部搔之麻痒者氣血不能

上榮也用補中益氣湯若痿軟筋攣者血氣不能滋養也
也用補中益氣湯佐以六味地黃丸

一口古生瘡或咽喉疼痛若飲食喜冷大便秘結者實熱也
也用四順清涼飲肌熱惡熱煩渴引飲者血虛也用當歸補血湯
飲食惡寒大便不實者虛熱也用十全大補湯熱從下或從足起者
腎虛熱也用加減八味丸若飲食難化四肢逆冷者命門火衰也
也用八味地黃丸一牙齒作痛或牙齦潰爛若喜寒惡熱屬胃火加味清

胃散為主惡寒喜熱屬胃虛補中益氣湯為主

一自汗盜汗蓋自汗屬氣虛盜汗屬血虛自汗用補中

益氣湯送六味地黃丸盜汗用當歸六黃湯

內芩連黃
栝炒黑用

送六味地黃丸若因勞心而致以歸脾湯倍用茯苓酸

棗仁

一吐痰或作喘若右寸脉浮緩者肺氣虛也用六君子

湯加桔梗右寸脉洪滑者肺經有熱也用瀉白散右寸

關脉浮緩遲弱者脾肺氣虛也用六君子湯加桔梗黃

芤右寸關脉洪滑遲緩者脾熱傳肺也用瀉白瀉黃二散右尺脉微弱者命門火衰而脾肺虛也用人參理中丸如不應用八味地黄丸右寸脉洪數者心火尅肺金也用人參平肺散如不應用六味地黄丸左寸關脉洪弦數者心肝二經有熱也用柴胡清肝散如不應佐以牛黃清心丸清其風熱仍用六味地黄丸以鎮陽光左尺脉數而無力者腎虛而水泛上也用六味地黄丸加五味子以滋陰如脉微細或手足冷或兼喘促急用八

味地黄丸以補陽

一舌赤裂或生芒刺兼作渴引飲或小便頻數不時發熱或熱無定處或足心熱起者乃腎水乾涸相火亢盛用加減八味丸主之佐以補中益氣湯若誤用寒涼之劑必變虛寒而歿

一口舌生瘡作渴不止不時發熱或晝熱夜止或夜熱晝靜小便頻數其熱或從足心或從兩脇或從小腹中起外熱而無定處者此是三陰虧損之症也用加減八

味丸為主佐以十全大補湯若誤用寒涼治火之劑復傷脾胃胸腹虛痞飲食少思或大便不實小便不利胸腹膨脹肢體患腫或手足俱冷者此足三陰虧損之虛寒症也急用加減金匱腎氣丸亦有復生者

一肚腹腫脹若朝寬暮急屬陰虛暮寬朝急屬陽虛朝暮皆急陰陽俱虛也陽虛者朝用六君子湯夕用加減腎氣丸陰虛者朝用四物湯加參朮夕用加減腎氣丸真陽虛者朝用八味地黃丸夕用補中益氣湯若肚腹

痞滿肢體腫脹手足並冷飲食難化或大便泄瀉口吸
氣冷者此真陽衰敗脾肺腎虛寒不能司攝而水泛行
也急用加減腎氣丸否則不救也

一發熱惡寒若寸口脉微名陽氣不足陰氣上入陽中
則惡寒也用補中益氣湯尺部脉弱名陰氣不足陽氣
下陷於陰中則發熱也用六味地黄丸若暑熱冷而肢
體倦怠此濕熱所乘屬陰氣虛而病氣實也當專補陽
氣用補中益氣湯若發熱大渴引飲目赤面紅此血虛

發熱屬形病俱虛也當專補陰血用當歸補血湯

一發熱作渴若右寸關脉浮大而無力者脾肺之氣虛也
也用補中益氣湯數而有力者脾肺之氣熱也用竹葉石膏湯
寸脉微數而無力者肺氣虛熱也用竹葉黃芪湯尺脉微細或微數而無力者命門火衰也用八味地黃丸
左寸關脉數而有力者心肝之氣熱也用柴胡梔子散數而無力者心肝之氣虛也用六味地黃丸尺脉數而無力者腎經虛火也用加減八味丸大凡瘡愈後

口渴或先渴而患瘡或口舌生瘡或咽喉腫痛或唇裂
舌黃目赤痰涎上湧者皆敗症也非此丸不能救

一眼目昏弱或内障黑花或血虛神勞用滋陰腎氣丸
若視物無力或見非常之狀屬陰精虛弱用滋陰地黃
丸若視物無力或視物皆大屬陽盛陰虛用六味地黃
丸若目緊體倦或肌膚麻木屬脾肺氣虛用神效黃芪
湯若至夜目暗燈下亦暗屬陽虛下陷用決明夜靈散
若眼暗體倦内障耳鳴屬脾胃氣虛用益智聰明湯益

五臟六腑之精氣皆稟受於脾土上貫於目脾為諸陰之首目為血脉之宗當補脾土為善

一衄血吐血若左寸關脈數而無力血虛也四物加參
木浮而無力氣虛也補中益氣湯尺脈數或無力腎虛
也六味地黃丸右寸關脈數而有力者肺胃熱也犀角
地黃湯數而無力者肺胃虛熱也先用濟生犀角地黃
湯後用四物湯加參苓白朮尺脈數無力陰虛也用六
味地黃丸若面黃目赤眵多手麻者脾肺虛也用黃芪

芍藥湯

一飲食少思若因胃氣虛而不能食用四君子湯若因脾氣虛而不能化用六君子湯大便不實或嘔吐者脾氣虛寒也用六君子湯加乾薑木香若作嘔口渴或惡冷飲食者胃氣虛熱也用五味異功散喜冷飲食者胃氣實熱也用瀉黃散

一帶下因經行產後外邪入胞傳於五臟而致之其色青者屬于肝用加味道遙散加防風濕熱壅滯小便赤

瀋用前散加炒黑龍膽草肝血不足或燥熱風熱用六
味丸逍遙散色赤者屬於心用小柴胡湯加黃連山梔
當歸思慮過傷者用妙香散六味丸色白者屬於肺用
六味丸補中益氣湯加山梔色黃者屬於脾用六味丸
六君子湯加山梔柴胡不應用歸脾湯色黑者屬於腎
用六味丸氣血俱虛用八珍湯陽氣下陷用補中益氣
湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃柏氣虛痰飲四
七湯送六味丸若病久元氣下陷或尅伐所傷但壯脾

胃升陽氣為善若拘於人之肥瘦而用燥濕瀉火之藥
反傷脾胃為患不淺

一二便下血若右關脉浮數氣虛而熱也用四君子加
升麻當歸尺脉浮大或微弱元氣下陷也用補中益氣
湯左關脉洪數血虛也用四物湯加炒山梔升麻秦艽
脉遲緩或浮大氣虛也用四君子湯加升麻炮薑尺脉
洪數或無力者腎虛也用六味地黄丸若因房勞傷損
精氣陰虛火動而小便下血諸血病者不問脉症百端

但用前九料煎服為善

一泄瀉在五更或侵晨乃脾腎虛五更服四神丸日間服白朮散或不應或愈而復作急用八味丸補命門火以生脾土其瀉自止

一大便不通屬脾肺虧損大腸津液乾涸或血虛火燥不可計其日期飲食數多必待腹滿脹自欲去而不能乃熱在直腸間也用猪膽汁潤之若妄服苦寒辛散之劑元氣愈傷或通而不止或成中痞之症若氣血虛者

用八珍湯加麻子仁腸胃虛者用補中益氣湯加麻子
仁腎液不能滋潤用六味地黄丸加麻子仁若厚味積
壅小便淋秘者肝腎虛也用六味地黄丸以滋腎水用
補中益氣湯以補脾胃若發熱晡熱用六君子湯加味
逍遙散養陰血清風熱若兼筋骨痛先用透經解學湯
秦朮地黄湯後用八珍散加牡丹皮柴胡主之若誤服
風劑而傷陰血者用易老祛風丸若兩股或陰囊或兩
足必用四生散地黄丸為善若誤服草烏川烏之類或

敷巴豆砒石等味脫肉腐潰反成癰症治者審之

一面赤搔痒或鬢毛脫落屬肺經風熱用人參消風散
樺皮散氣虛用補中益氣湯加天麻僵蠶血虛用加味
逍遙散加鈎藤鈎面發紫泡或成塊或鬢毛脫落屬肝
經風熱先用小柴胡湯加山梔丹皮鈎藤鈎後用加味
逍遙散凡症屬肝經血燥生風但宜滋腎水生肝血則
火自息風自定痒自止

一遍身疙瘩或癩疹搔痒此風熱傷血用羌活當歸散

氣虛者佐以補中益氣湯加山梔鉤藤鉤血虛者佐以
加味逍遙散加鈎藤鉤若手足皴裂不問黯白或在手
足腿腕搔起白皮此風熱而秘濇用清胃散加芍藥蓋
腎開竅於二陰精血不足則大便秘塞而不通矣須用
六味地黃丸補中益氣湯以滋化源

一小便不利若不渴而不利者熱在下焦血分也用滋
腎丸渴而不利者熱在上焦氣分也用清肺散腎經陰
虛而不利者用六味地黃丸熱結膀胱而不利者用五

苓散元氣虛而不能輸化者用補中益氣湯脾肺之氣燥而不能化生者用黃芩清肺飲若轉筋便閉氣喘不問男女孕婦急用八味丸緩則不救

一白濁足三陰經主之屬厚味濕熱所致者用加味清胃散肝腎虛熱者用六味地黃丸為主佐以逍遙散脾腎虛熱者用六味丸佐以六君子湯肝脾鬱滯者六味丸佐以歸脾湯脾肺氣虛者六味丸佐以補中益氣湯濕痰下注者益氣湯佐以六味丸

癩瘍類症

類症者與癩形狀相似而所因不同也

一兩腫如癬搔痒久則膿水淋漓或搔起白皮者名腎臟風也用四生散以祛風邪用六味地黃丸以補腎水若頭目不清內熱口乾體倦痰熱血燥秋間益甚故俗名鴈來風宜用羌活白芷散加味逍遙散氣虛者佐以補中益氣湯加皂角刺鈎藤鈎血虛者佐以八物湯加柴胡牡丹皮或加味逍遙散兼服

一肢體或腿臂腕間患痞癩而遊走不定者赤曰赤遊

風白曰白遊風為血虛陰火內動外邪所搏之症白用人參消風散赤用加味逍遙散氣血俱虛用八珍湯晡熱內熱用加味逍遙散六味地黃丸

一遍身或頭面起疙瘩或如霞片或破而膿水淋漓或痒痛寒熱乃肝火血虛也用加味逍遙散若口苦脇痛小便淋瀝肝火血熱也用柴胡清肝散若婦女夜間譫語發熱熱入血室也用小柴胡湯加山梔生地黄血虛者四物合小柴胡湯病退却用逍遙散以健脾胃生陰

血此症多有因怒氣而發者治當審之

一婦人肢體癢疹疥瘡搔破成瘡膿水淋漓熱渴眩暈
日晡益甚者用四物湯加柴胡山梔丹皮清肝火補肝
血若煩熱體倦頭目不清用八珍散加丹皮山梔補脾
氣生陰血若自汗盜汗月水不調肚腹作痛用八珍湯
六味丸若食少體倦心忪盜汗經閉寒熱用八珍湯佐
以加味逍遙散若病久元氣怯弱用十全大補湯佐以

歸脾湯

一女子十三四或十六七而天癸未至或婦人月經不調發赤癰痒痛此屬肝火血熱用小柴胡湯加山梔生地黃牡丹皮防風

一生蟲者乃相火制金不能平木而化耳非風邪所生也但滋腎水生肝血或佐以灸承漿之類說見本症一敷砒霜患處作痛或腐潰用濕泥頻塗換之若毒入腹胸膈苦楚或作吐瀉飲冷米醋一二杯即止多亦無妨生菜豆末芝麻油亦可

一敷貼雄黃藥悶亂或吐瀉用防已煎湯解之一服辛
熱藥而鬢髮脫落者乃肝經血傷而火動非風也用四
物湯六味丸以滋肝血生腎水一服川烏草烏等藥悶
亂流涎或昏憤嘔吐或出血吐血用大豆遠志防風甘
草任用一味煎湯解之大凡服風藥過多皆宜用之未
應急用甘草生薑汁

一敷貼巴豆之藥患處作痛肌肉潰爛以生黃連為末
水調敷之若毒入內吐瀉等症更以水調服一二錢大

小豆苜蓿汁俱可

一敷貼藜蘆毒入內煎葱湯解之

一服祛風尅伐之藥嘔吐少食胸膈不利或形氣倦怠
等症用六君子湯以補陽氣若煩躁作渴飲食不思或
晡熱內熱面赤發熱用四物湯加參朮以生陰血餘從
各門治之

本症治驗

一男子冬間口苦耳鳴陰囊濕痒來春面發紫塊微腫

麻木至冬遍身色紫不知痛痒至春紫處俱大至夏漸潰又至春鬢落指潰此患在肝膽二經令刺手指縫并臂腿腕出黑血先與再造散二服下毒穢更以小柴胡合四物湯加白芷防風天麻角刺漸愈又與換肌散但遍體微赤此血虛有火因家貧未得調理秋間發熱至春面仍發塊用前散并養血藥喜年少謹疾得愈

一膏粱之人鼻壞鬢落指脫體潰熱渴晡甚用四物湯加酒炒黑黃栢知母五味麥門白芷天麻角刺三十餘

劑熱渴少止時仲夏精神倦怠氣喘身熱小便黃數大便澹泄此元氣虛而時熱勝也用補中益氣湯頓安乃與換肌散及益氣湯兼服兩月更以生脉散代茶飲瘡少退時至仲秋眩暈少食自汗體重大便澹數此亦時濕之症用清燥湯調理而愈又用補中益氣湯少加酒炒黑黃栢知母角刺天麻兩月餘而瘥又因勞倦耳聾熱渴誤服祛風藥病氣益劇身發赤疹與益氣聰明湯月許而愈

一男子赤痛熱渴膿水淋漓心煩掌熱目昧語瀼怔忡
不寧此心經受症也用安神丸兼八珍湯少加木通炒
黑黃連遠志元氣漸復却行砭刺外邪漸退但便燥作
渴用柴胡飲并八珍湯而愈再用換肌散而瘥

一男子肚見青筋面起紫泡發熱作渴寅卯時甚脉弦
數腿轉筋小便瀼此肝經火症先用柴胡飲熱退便利
却用小柴胡合四物湯加龍膽草炒山梔三十餘劑及
八珍湯加柴胡山梔養其氣血乃用換肌散去其內毒

而安年餘因勞役飲食失宜寒熱頭痛遍身赤疹自用
醉仙散而歿

一男子面發紫疔瘡膿水淋漓睡中搐搦遍身麻木漸
發赤塊勞怒則痒肝脉洪大砭刺臂腿腕各出血用
清胃湯加大黃角刺四劑煎下瀉青丸肝脉少退以升
麻湯數劑下前丸諸症少愈却用寶鑑換肌散斤許又
用小柴胡合四物湯加參朮天麻角刺百餘劑及六味
地黃丸半載而愈後因勞遍身麻痒脉微而遲此氣血

俱虛不能榮於腠理用十全大補湯加五味麥門調理
年餘而安

一男子面赤發紫泡下體痒痛午後發熱大便燥黑此
火盛而血虛也用再造散及四物湯加防己膽草及刺
腿指縫出毒血而便和仍以前藥加白朮白芷茯苓羌
活獨活而便黃仍以四物去膽草防己少用獨活加玄
參草薢五十餘劑而瘡退却用補中益氣湯加天麻麥
門而氣血漸充時仲秋靈雨遍身酸痛用清燥湯而安

隨用換肌散胡麻散八珍湯兼服而愈

一上舍面發腫肌如癬後變疣瘡色紫搔之出水此脾肺之症也先用清胃湯以清胃熱解表毒又用四物湯加山梔黃芩柴胡皂角刺甘草節以養陰血祛風熱及砭臂腿腕手足指縫并患處以去毒血疎通隧道乃與八珍湯加白芷皂角刺五加皮全蝎及二聖散兼服月餘以養陰血治瘡毒又與補氣瀉滯湯少愈再與換肌散而全愈後因勞倦遂發赤暈日晡尤甚以四物湯加

丹皮柴胡山梔并用補中益氣年餘雖勞而不發

一男子遍身如癬搔痒成瘡色紫麻木搗之則痛小便數而少此脾胃受症邪多在表用清胃散更砭刺患處并臂腿腕出黑血神思漸爽但惡寒體倦口乾此邪氣去而真氣虛也以大劑參芪芎歸蒺藜桔梗數劑元氣頓復却用八珍湯加黃芪白芷蒺藜天麻軟柴胡及二聖散治之其瘡漸愈後用換肌散八珍湯等藥調理半載而痊後仍發誤用尅伐攻毒患兩感傷寒而死

一男子遍身疥瘡搔則痒搯則痛便閉作渴此邪在內也治以再造散二服微下三次用桃仁承氣湯加當歸四劑及砭出黑血漸知痛痒但形體倦怠用培養之劑復其元氣又用二聖散其瘡頓愈更大補年餘而康後患痰涎壅盛舌強語澁用二陳蒼朮黃柏知母澤瀉四劑而愈再用補中益氣湯調理而安

一男子素清苦鬢盡落病在肝膽二經也乃刺臂腿腕及患處出黑血空心服八珍湯加五味胡麻首烏威靈

食後服換肌散喜其無兼變之症又能篤守禁忌不半年而痊

一儒者脚心或痒痛或麻痒或腫脹二年後身體作痒漸變疣瘡發熱耳鳴日晡益甚此屬腎虛也乃砭刺臂腿腕及手足指縫去其瘀血用六味地黄丸料五味柴胡五十餘劑以補腎又用換肌散祛風丸以治瘡各斤許瘡漸愈得滋補守禁而痊

一上舍遍身患之形病俱虛余謂須用調補元氣完復

方治其瘡不信略服蛇酒以攻內毒更敷砒霜等藥以蝕外毒頓加嘔吐清水體痛如錐或以為毒氣外發余曰脾主肌肉此因毒藥脾傷而然也反服祛毒之劑吐瀉不止而歿

一男子用藥湯薰洗汗出不止喘嗽不食腹鳴足冷肢體抽搐余謂此因熱傷元氣腠理不密汗出亡陽耳是日果卒

類症治驗

欽天薛天契年踰六旬兩賺膿水淋漓發熱吐痰數年
不愈屬腎藏風症用四生散而瘥年餘復作延及遍體
日晡益甚痰渴盜汗唇舌生瘡兩目皆赤此腎經虛火
用加減八味丸諸症悉愈三年後小便淋瀝莖道瀉痛
此陰已痿思色而精內敗也用前丸及補中益氣湯加
麥門五味而愈

翟鴻臚兩賺生瘡漸至遍身各大寸許腫而色黯時出
血水吐痰咽乾盜汗心煩溺赤足熱日晡益甚形體消

瘦左尺脉洪數無力余以為腎經虛火用六味九不月
諸症悉退三月元氣頓復

松江掌教翟立之素善飲遍身疙瘩搔起白屑上體為
甚面目焮腫成瘡結痂承漿潰膿眼赤出淚左關脉洪
數有力或作癘風治之膿潰淋漓余謂肝火濕毒以四
物湯加乾葛連翹山梔柴胡芩連一劑諸症悉退四劑
全退兩睛各顯青白翳一片亦屬肝火再劑翳去乃用
六味九而愈

一儒者身發疙瘩時起赤暈憎寒發熱服癘風之藥鬢
落筋攣後疙瘩漸潰日晡熱甚肝脉弦洪餘脉數而無
力此肝經血虛風熱也先以小柴胡合四物湯加牡丹
皮酒炒黑黃柏知母肝脉漸和晡熱漸退又用八珍湯
加山梔寒熱頓去再與加味逍遙散加參朮鈞藤鈎木
賊服兩月瘡悉愈而鬢漸生後因怒復作用小柴胡湯
加芎歸鈞藤鈎木賊而愈後勞役發熱誤用寒劑不時
風痒日晡赤暈早與補中益氣湯加五味麥門山藥午

後與加減八味丸尋愈後食炙煖等物痰盛作渴仍發
疣瘡小便白濁右關脉滑大有力用補中益氣湯加山
梔諸症悉退

一男子愈後肌膚作痒口乾飲湯此中氣虛不能化生
津液榮養肌膚午前服七味白朮散補中益氣湯午後
服參芪芍歸五味麥門少愈又用十全大補湯加五味
麥門全愈

一男子愈後因勞惡寒頭痛體倦余謂惡寒乃胃氣虛

不能護衛肌表頭痛乃清氣虛不能上升巔頂用補中益氣湯加五味麥門益甚更兼口噤脉微細如無又加附子五分四劑而瘥

一男子愈後每早吐痰碗許形體倦怠此中氣虛而不能尅化飲食以參芪白朮陳皮半夏麴為丸臨卧服早間服補中益氣湯不月而愈蓋胃為五穀之海脾為消化之器若脾氣健旺運行不息痰自無矣

一男子愈後惡寒頭暈食少體倦屬中氣虛弱用補中

益氣湯加蔓荊子并十全大補湯加五味子血氣充而愈

一男子面起赤暈時或發腫臂手亦然搔起白屑服癘風藥內熱體倦脉大而虛此因元氣虛而陰血復傷用六味地黄丸補中益氣湯而尋愈

一男子兩目俱赤遍身痒痛搔起白皮此肝肺陰虛誤服祛風燥劑鼻赤面紫身發疙瘩搔出血水用升麻湯下瀉青丸數服又用加味道遙散數劑身鼻漸白疙瘩

漸消又用四物湯加參芪柴胡山梔并換肌散各百餘服喜其年少謹疾全愈

一男子愈後寒熱往來體瘦倦怠飲食不甘此因元氣虛而變症也午前用補中益氣湯加麥門五味午後用四物湯加麥門五味而愈

一男子遍身搔痒後成瘡出水洒浙惡寒皮膚皴起鬢毛漸落大便秘結小便赤少此屬肺火為患用補氣瀉榮湯四劑諸症漸退但倦怠惡寒小便清少此邪氣去

而真氣虛也用補中益氣湯兼換肌散半載元氣復而諸症退時仲秋忽大便秘小便頻數體倦食少洒淅體重此濕邪乘虛而作用東垣益胃湯二劑頓安仍用前藥調理三月餘全愈

一儒者遍身作痒搔破膿水淋漓鬚毛脫落如癘風症久服祛風等藥致元氣虧損余用補中益氣湯加茯苓而愈後失調理日晡熱甚用八珍湯加五味麥門五十餘劑而痊

一儒者懷抱久鬱先四肢如癘略祛風消毒氣血愈虛延及遍身寒熱作渴肢體倦怠脉洪大而虛謂余何也余曰始因脾鬱血虛陰火妄動後因藥傷脾胃元氣下陷遂用補中益氣湯培補脾胃升舉元氣用歸脾湯解散鬱火生發脾血更以六味丸益腎肝精血引虛火歸源不兩月諸病悉愈

一男子遍身生瘡膿水淋漓晡熱口乾兩足發熱形體消瘦雜服風瘡藥六年未愈尺脉洪數而無力此腎經

瘡也如小兒腎疳之症用加減八味丸不半載而痊
一男子遍身生瘡似疥非疥膿水淋漓兩腿為甚作痒
煩熱肢體倦怠年餘不愈余以為腎經虛火用加減八
味丸而痊

一男子秋間發疣瘡兩月餘漸高有赤暈月餘出黑血
此風熱血虛所致先用九味羌活湯風熱將愈再用補
中益氣湯而愈後不慎房慾復作盜汗晡熱口乾吐痰
體倦懶言用補中益氣湯加減八味丸頓愈

一男子兩掌每至秋皮厚皺裂起白屑內熱體倦此肝脾血燥故秋金用事之時而作用加味道遙散加川芎熟地三十餘劑而愈再用六味丸加五味麥門服之半載後手足指縫臂腿腕皮厚色白搔之則木久服前藥方愈

一男子因大怒發熱鬢髮頓落蓋髮屬腎而鬢屬肝此肝腎素虛為怒陰火愈盛銷燥精血而然也用六味丸料加柴胡山梔黃柏數劑漸生又二十餘劑而完

一男子遍身搔痒服祛風辛燥之劑鬢髮脫落余謂前藥復傷肝腎精血虛而火內熾所致朝用八珍湯加麥門冬五味子夕用六味丸料加當歸黃芪治之風熱退而鬢髮生矣

一男子染時瘡服換肌散之類鬢毛頓落遍身作痒或時赤暈乃燥藥損其陰血陽氣偏旺而然耳朝用四物湯倍熟地加茯苓白朮牡丹皮山梔生甘草夕用六味丸料加當歸黃芪治之瘡症既愈鬢毫亦生

一男子素不慎房勞其髮忽落或發熱惡寒或吐痰頭暈或口乾作渴或小便如淋兩足發熱或冷至脛屬足三陰虧損而陰火內熾朝用十全大補湯夕用六味丸料加炒黑黃栢枸杞子治之諸症退而髮漸生

一男子素膏粱醇酒患腎臟風延及遍身服癘藥益甚又用撚藥於被中薰之嘔吐腹脹遍身浮腫潰爛膿水淋漓如無皮而死

一男子足三陰虛患血風瘡症誤服祛風散毒之劑外

敷斑猫巴豆等類肌肉潰爛嘔吐腹膨或泄瀉足冷或
煩熱作渴此藥復傷脾胃虛敗也辭不治不越月而歿
一婦人膿水淋漓發熱作渴體倦惡寒經水不調久而
不愈此肝脾虧損而虛熱也先用補中益氣湯加川芎
炒山梔元氣漸復更以逍遙散而瘡漸愈

一婦人性急善怒月經不調內熱口苦患時瘡服敗毒
之藥膿水淋漓熱渴頭暈日晡益甚用加味逍遙散服
之漸愈因大怒月經如湧眼赤出淚用四物湯加山梔

柴胡連芩數劑而愈年餘手足臂腕起白點漸大搔起
白屑內熱盜汗月經兩月餘一至每怒或惡寒頭痛或
不食作嘔或胸乳作脹或腹內作痛或小便見血或小
水不利或白帶下注此皆肝木制伏脾土元氣虛而變
症也用補中益氣湯加炒黑山梔及加味歸脾湯間服
半年而愈

一婦人久鬱患在四肢腿腕尤甚誤用敗毒寒涼之劑
晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥此鬱火傷脾

也用歸脾湯數劑後兼服逍遙散五十餘劑而愈

一婦人身如丹毒搔破如癩熱渴頭暈日晡益甚此屬肝經風熱血燥用加味逍遙散而愈

一婦人素晡熱月經不調先手心赤痒至秋兩掌皮厚皸裂時起白皮此皆肝脾血燥用加味逍遙散加荆芥釣藤鈎川芎熟地五十餘劑又用歸脾湯二十餘劑乃服六味丸而不再發

一婦人兩腿腕紫黯寸許搔破出水或用祛風砒血年

餘漸屑如掌許乃服草烏等藥遍身搔痒時出血水內
熱體倦飲食無味月經三月一至脉洪而數按之則瀉
此燥劑愈傷脾血也先以補中益氣湯加芍藥川芎五
味十餘劑乃與加味逍遙散加熟地鈞藤鈞二十餘劑
再用歸脾湯加川芎熟地黃治之而不發

一婦人日晡身痒內外用追毒祛風之劑膿水淋漓午
前畏寒午後發熱殊類癘風用補中益氣湯加山梔鈞
藤鈞又以加味逍遙散加川芎而愈

一婦人手心色赤搔痒發熱頭暈作渴晡甚服祛風清熱之藥膚見赤痕月經過期用加味逍遙散倍熟地熱止痒退更以四物湯加柴胡參芪炙甘草茯苓頭清渴止再用四物湯加參朮茯苓山梔赤暈亦消

一婦人素清苦四肢似癩疥作痒出水怒起赤暈服祛風敗毒等劑赤暈成瘡膿水淋漓晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥此鬱傷脾血也用歸脾湯逍遙散兩月而痊

一婦人遍身疙瘩搔痒敷追毒之藥成瘡出水寒熱脇痛小便不利月經不調服祛風之劑形體消瘦飲食少思此肝火血燥生風前藥益傷脾血耳先用歸脾湯二十餘劑又用加味逍遙散二十餘劑諸症漸愈乃用六味丸調理而瘡此等症候服風藥而死者多矣

一婦人愈後唇腫皸裂食少肌瘦晡熱益甚月水過期半年漸閉時發渴躁專於通經降火發渴愈甚唇脹出血此脾經虛熱而血愈耗也治以四物湯加參苓芪朮

升麻丹皮柴胡山梔外症漸愈又用八珍湯加丹皮柴胡五十餘劑月水調而諸症痊

一小兒面部浮腫遍身如癩半年後變疣痞色紫作痒敷巴豆等藥皮破出水痛痒寒熱大便堅硬脾肺脉洪數而實先用防風通聖散以解表裡便利調和又用四物湯加荆防黃芩柴胡皂角刺甘草節以涼血祛毒諸症漸退更以八珍湯加白朮荆防角刺五加皮而愈後但勞則上體發赤暈日晡益甚此屬氣血虛而有火用

四物湯加丹皮參朮柴胡治之稍退又用補中益氣湯加酒炒黑黃柏知母月餘全愈

一小兒遍身患疥如癩或痒或痛肢體消瘦日夜發熱口乾作渴大便不實年餘矣此肝脾食積鬱火用蘆薈丸不月而愈

一女子十三歲善怒遍身作痒出水用柴胡川芎山梔芍藥以清肝火用生地當歸黃芩以清肝血用白朮茯苓甘草以健脾胃而愈半載後遍身起赤痕或時眩暈

寒熱余曰此亦肝火熾盛血得熱而妄行其夜果經至
一女子赤暈如霞作痒發熱用小柴胡湯加生地連翹
丹皮而愈大凡女子天癸未至婦人凡經不調被驚着
惱多有此症

一小兒十五歲遍身似疥非疥膿水淋漓晡熱口乾形
體骨立四年矣此腎肝之症用加減八味丸而痊

韓氏子年十四早喪天真面紅腫如風狀不時舉作或
誤用癘風藥內虛發熱口燥煩渴甲辰冬邀治因請教

烏先生云此內傷不足陰火上炎而類赤遊風症也藥宜滋其陰則火自降補其本則標自退大經領教用四君加參芪四十劑又用此作丸服斤許不兩月而平復若從有餘治之則謬誤多矣謹錄呈上乞附藥案以惠後之患者嘉靖丁未仲春門人朱大經頓首拜書

薛氏醫案卷十七